

COMUNICACIONES

TÍTULO

PROTOCOLO DE VIGILANCIA DEL STAPHILOCOCCUS AUREUS RESISTENTE A METICILINA (SAMR). RESULTADOS TRAS 1 AÑO DE FUNCIONAMIENTO

INTRODUCCIÓN

SAMR es uno de los patógenos nosocomiales de mayor importancia, que se asocia a una mayor mortalidad y costes económicos para los servicios de salud.

OBJETIVOS

Identificar pacientes colonizados con SAMR, limitar la diseminación en pacientes hospitalizados.

METODOLOGÍA

Identificación de servicios diana, población susceptible, elaboración y puesta en marcha del protocolo correspondiente, toma de muestras e implementación de medidas de aislamiento de contacto.

RESULTADOS

Durante el año 2010 la población susceptible de riesgo fueron 843 pacientes, que fueron seguidos por el Equipo de Control de Infección Nosocomial (ECIN). De ellos, 84 (10%) presentaban colonización por MRSA. Tras comparar los datos de infecciones por MRSA con años anteriores se observa una sustancial disminución en la incidencia. Asimismo, disminuyó el porcentaje de MRSA con respecto al total de aislamientos de Staphilococcus.

CONCLUSIONES

La puesta en marcha del protocolo de vigilancia permitió identificar poblaciones susceptibles de colonización y elaborar medidas de prevención diana que redujeron significativamente la incidencia de SAMR en el Complejo Hospitalario de Badajoz (CHUB).